

Ihre Patientin / ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und benutzt

**Lantus®, Levemir®, Abasaglar® oder Toujeo®:**

Wir empfehlen folgendes Vorgehen vor einer Endoskopie:

**2 Tage vor der Untersuchung:**

- normale Applikation
- Bei Hypoglykämie-Neigung oder HbA1c <6.5%: 2/3 der üblichen Insulindosis

**1 Tag vor der Untersuchung:**

- Basis-Insulin am Morgen: **2/3 der üblichen Insulindosis** und Kontrolle des Blutzuckers im Tagesprofil
- Basis-Insulin am Abend: **die Hälfte der üblichen Insulindosis** und Kontrolle des Blutzuckers vor dem Zubettgehen. Bei Blutzucker unter 6 mmol/l ist eine Zwischenmahlzeit und BZ-Kontrolle empfohlen

**Am Untersuchungstag:**

- Ein Blutzucker-Tagesprofil ist empfohlen
- Basis-Insulin am Morgen: die Hälfte der üblichen Insulindosis **nach** der Endoskopie, vor dem Essen
- Basis-Insulin am Abend: **Gesamte übliche Insulindosis** sofern der Patient normal Abendessen kann **und** der Blutzucker über 6 mmol/l liegt. Ein Blutzucker-Tagesprofil ist empfohlen

Wir dürfen Sie bitten das genaue Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Gerne können Sie uns für individuelle Rückfragen und Einschätzungen kontaktieren.

Herzliche Grüsse

Vivomed – Gastroenterologie Bern